

Afdeling Hollandse Delta.

Broedvogels Westplaat

Mededelingnummer: 314



Auteur: Henk Walbroek

© KNNV afdeling Hollandse Delta

Broedvogelonderzoek 2020

Locatie – ZHL

Een publicatie van de Vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV. Mededeling 314

Auteur: Henk Walbroek

Inventarisatie door: Henk Walbroek , Bert van Dijk



Broedvogelinventarisatie:

Gebied: Westplaat

Teljaar: 2020

Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap (beheerder).


Opdracht: Inventarisatie van broedvogels.

Tellers: Henk Walbroek, Bert v Dijk, leden van de vogelwerkgroep van de KNNV afd. Voorne.

Gebied: Topogr. krt. 36 – Atlasblok 38 – KM-blok 5
Topogr. krt. 37 – Atlasblok 31 – KM-blokken 31+32+33.

Noord = Waterkering van de Maasvlakte (zuidzijde).
Zuid = Slikken van Voorne met Westplaat en de zee.
Oost = Fietspad over Brielse Gatdam.
West = Slufterstrand Maasvlakte.

De in de tekening hieronder gearceerde sectoren, vormen het geïnventariseerde gebied!



Gebiedstype :

Een langgerekte strook kunstmatig aangelegd duinterrein, met daaraan grenzend een schor, slikken en zandbanken/strand. Het profiel, komt sterk overeen met elk aan zee grenzend jong duinterrein.

Het schor grenst aan een wadachtig gebied (Slikken van Voorne) en de zee. Langs het schor ligt een strook grond met een wandelpad en aan weerszijde daarvan bosschages. Deze bosschages liggen aan de noordzijde van het wandelpad steil op tegen het talud van de waterkering van de Maasvlakte.

Westelijk van de Slikken en zuidelijk van de Kleine Slufter is de zee met strand en zandplaten. Het schor spoelt vrijwel alleen onder bij storm en zeer hoogwater. Er zijn de afgelopen jaren veel **geulen** ontstaan en veel **vegetatie** waardoor je er moeilijk doorheen kan lopen.

Eén enkel wandelpad loopt in de lengte richting door het oostelijke gedeelte, van het fietspad op de Brielse Gatdam tot aan een kijkscherp (2,5 km).

Het oostelijke deel van het gebied heeft een wandelpad met smalle- en bredere stroken met;

- Struiken, zoals; wilg, braam, vlier, duindoorn, vuilboom, wegedoorn, rozen, kardinaalshoed, kornoelje.
- Bomen, zoals; wilg, abeel, populier.
- Planten, zoals; heeblaadjes, koninginnekruid, brandnetel, watermunt, duinriet, biezen e.a.

Samen met het aangrenzende schor en de hoger gelegen waterkering (kwel) kan dit gebied als drassig worden gekenmerkt.

De struikenpartijen zijn vrijwel overal ondoordringbaar, met her en der een solitair staande boom of een groepje bomen met een max. hoogte van ca. 8 m.

Het westelijk deel bestaat uit al of niet kunstmatig aangelegde duinen en duintjes, begroeid met biestarwegras, helmgras en duindoorns. Dit terrein is niet vrij toegankelijk en onbegaanbaar door de dichte begroeiing met duindoornstruiken en soms een steile glooiing.

Dit gedeelte is de afgelopen jaren erg veranderd. Door invloed van wind en zee zijn de duinen op de plaat nagenoeg verdwenen maar er ontwikkelen zich embryonale duinen op die plek. De plaat breidt zich wel uit naar het zuiden die langzaam wat hoger wordt. En duinvorming vind plaats tegen het steile gedeelte en er vind op verschillende plaatsen vind begroeiing plaats zeker aan de zuidkant van de plaat .

Westelijk naast het natura 2000 gebied <Slufter> heeft zich de laatste jaren een badstrand en een Kite-surf plek ontwikkeld. In het gebied zijn 2 slenken die met hoogwater vol lopen wat ideaal is voor de badgasten maar vooral ook voor de Kiteurs .Daardoor wordt het gebied in toenemende mate steeds drukker door de Kite-Surfers en badgasten . Dit geeft een grote druk op de broedvogels in het natura 2000 gebied.



Opvallende feiten:

De bruine kiekendief was dit jaar ook aanwezig 1 juveniele vogel gezien. De havik is en blijft een stiekemerd wel gebroed maar resultaat onbekend. De scholekster heeft dit jaar niet gebroed wel pogingen gedaan maar geen resultaat, mogelijk door **de vos** . Er waren dit jaar 5-6 territoria van de bontbekplevier met in totaal 12 jonge vogels.<Slufter>. Of alles vliegvlug geworden is betwijfel ik door de aanwezigheid van de **vos** waarvan veel sporen zijn gevonden . Tijdens het broedseizoen hebben zich daar totaal 8 koppels dwergsterns gevestigd. Het aantal waargenomen juveniele dwergsterns is 3 . De bergeenden <holenbroeders> broeden meestal in het westelijk gedeelte opvallend in dit seizoen was dat er geen juveniele bergeenden zijn waargenomen .Dit was ook het geval met de grauwe gans . Naast het natura 2000 gebied aan de westelijke kant heeft zich tijdens de afsluiting van het strand i.v.m het corona virus spontaan een dwergstern kolonie gevestigd. We zijn getipt door een wandelaar.

Enkele leden van de projectgroep strandbroeders hebben de volgende dag het gebied in samenwerking met een vertegenwoordiger van Vogelbescherming afgezet met palen, infoborden, draad en rood-wit lint.

In de loop van het seizoen waren er in totaal 40 territoria Dwergsterns en ook 4-6 territoria van de Bontbekplevier .

daar totaal 8 koppels dwergsterns gevestigd. Het aantal waargenomen juveniele dwergsterns is 3 . De bergeenden <holenbroeders> broeden meestal in het westelijk gedeelte opvallend in dit seizoen was dat er geen juveniele bergeenden zijn waargenomen .Dit was ook het geval met de grauwe gans . Naast het natura 2000 gebied aan de westelijke kant heeft zich tijdens de afsluiting van het strand i.v.m het corona virus spontaan een dwergstern kolonie gevestigd. We zijn getipt door een wandelaar.

Enkele leden van de projectgroep strandbroeders hebben de volgende dag het gebied in samenwerking met een vertegenwoordiger van Vogelbescherming afgezet met palen, infoborden, draad en rood-wit lint.

In de loop van het seizoen waren er in totaal 40 territoria Dwergsterns en ook 4-6 territoria van de Bontbekplevier .

Resultaten :

Waarnemingen Maasvlakte 2:

- 2/6 : 10 paar DS en 1 paar BB
- 7/6 : controle afzetting 1 nest DS 3 eieren en 10 territoria
- 11/6 : 9 nesten geteld DS
- 17/6 : 24 territoria DS en 3 territoria BB
- 25/6 : rondom 30 territoria DS
- 02/7 : 33 territoria DS 5 territoria met pullen verschillend juveniele zien lopen
Aan de zuidkant van de afzetting ook 5 territoria DS en 3 Territoria met BB
- 5/7 : DS 15 juveniele liepen in de afzetting gezien tijdens de storm
- 6/7 : Groot aantal nesten weggespoeld door storm en springtij paar DS aanwezig en 4 paar BB met juveniele vogels
- 10/7 : Na controle geen nesten meer van DS veel weggespoeld
- 12/7 : 4 paar BB en 7 juveniele
- 15/7 : 5 paar BB en 14 juveniele vogels
- 23/7 : 19 juveniele vogels geteld 6 koppels BB



Foto: Ad 't Hart

Telwijze:

Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON-richtlijn gedaan, echter:
Het inventariseren in het oostelijk deel geschiedde alleen vanaf het hoofdpad en de twee zijpaden zijn niet meer begaanbaar en bij laagwater ook langs de scheiding van schor en slikken.
Inventarisaties in het westelijk deel vond plaats door het volgen van de hoogwaterlijn en langs de weg aan de noordkant. De hoog gelegen waterkering van de Maasvlakte is overal te steil en ontoegankelijk door stekelige- en doornige struiken. De andere kant van de kering werd geteld vanaf de weg.

De geel gekleurde vakken hebben betrekking op de tellingen van de strandbroeders op de Maasvlakte 2

Teldata:

volgnr.	datum	aanv.	eind	temp.	wind ... Bft	bewolking	Henk	Bert	sectie
1	27-03-2020	07:00	11:30	9C	Nw 3	100%	x	x	O+W
2	09-04-2020	06:30	10:30	10 °C	NO 4	0%	x	x	O+W
3	24-04-2020	06:30	10:30	11°C	ZW 2	0%	x	x	O
4	08-05-2020	06:30	10:45	11 °C	ZW 3	0%	x	x	O+W
5	26-05-2020	06:15	09:10	12 °C	W 2	0%	x	x	O+W
6	10-06-2020	06:00	10:00	15 °C	NO 2	50%	x	x	O+1/2W
7	19-06-2020	09:00	10:00	18 °C	NO 2	25%	x		Slufter
8	02-07-2020	09:30	12:00	25 °C	NO 2	0 %	x		MV2
9	06-07-2020	19:00	20:00	17 °C	O 4	45 %	x		MV2
10	15-07-2020	14:00	15:45	17 °C	ZW 3	100 %	x		MV2
11	19-07-2020	09:30	11:00	18 °C	O 3	30 %	x		MV2

Waargenomen soorten:

In 2019 waren er 38 soorten waargenomen in 2020 zijn het 37 soorten .
Tijdens onze tellingen viel ons op dat er met laagwater weinig tot geen vogels op de slikken liepen.
In het algemeen zijn er minder territoria waargenomen ,een oorzaak is niet aan te geven misschien verandert de natuur en het leefgebied daar en de aanwezigheid van de Vos kan daar een rol in spelen.
De soorten die de laatste 5 jaar niet zijn waargenomen c.q. gebroed hebben zijn verwijderd uit de tabel: het betreft Turkse Tordel en Bosrietzanger .
De spotvogel en de groenling hebben zich dit jaar weer gevestigd .
Bij de dwergster en bontbekplevier in het overzicht staan 2 getallen .Het laatste getal heeft betrekking op de kolonie naast de Slufter <MV2>

Op de volgende pagina is er een overzicht vanaf 2009 t/m 2020.

Betekenis kleuren :

Soorten groen :Nieuw waarnemingen

Jaar rood : Minder waarnemingen

Jaar groen : Meer waarnemingen

Jaar wit : Gelijk gebleven

nr	soort	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Grauwe Gans	4	4	1	2	1	1	8	8	4	1	2	0
2	Bergeend	18	2	18	35	20	20	22	20	20	15	20	15
3	Wilde Eend	1	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0
4	Slobeend	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Bruine Kiekendief	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
6	Havik	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Buizerd	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
8	Fazant	11	9	9	8	3	6	5	8	9	5	2	3
9	Meerkoet	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Scholekster	2	5	4	2	3	3	6	7	13	7	2	0
11	Kluut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	Bontbekplevier	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5 - 6
13	Dwergstern	0	0	0	0	0	0	0	0	43	4	11	8 -40
14	Holenduif	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	Houtduif	4	2	1	2	4	1	1	1	2	2	3	3
16	Groenling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	Koekoek	1	1	1	1	1	0	3	1	0	0	1	1
18	Grote Bonte specht	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
19	Oeverzwaluw	6	183	15	15	14	26	30	81	0	0	0	0
20	Graspieper	4	4	3	3	1	3	1	3	1	3	3	5
21	Witte Kwikstaart	0	0	2	2	1	2	0	1	1	1	1	1
22	Winterkoning	12	12	10	16	5	15	27	28	25	31	19	14
23	Heggenmus	29	27	18	30	14	14	30	35	29	30	23	13
24	Roodborst	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2
25	Nachtegaal	26	20	21	25	27	28	34	29	18	10	32	17
26	Blauwborst	9	17	6	10	6	6	11	7	7	4	5	4
27	Roodborsttapuit	2	2	1	3	0	2	1	0	0	0	2	0
28	Merel	19	11	9	15	19	21	13	13	13	14	12	13
29	Zanglijster	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	2
30	Cetti,s zanger	0	0	0	1	3	1	2	4	6	6	5	4
31	Sprinkhaanzanger	0	2	3	1	3	0	2	3	3	4	1	0
32	Rietzanger	0	6	5	6	4	5	11	5	9	6	1	7
33	Spotvogel	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
34	Kleine Karekiet	4	5	9	10	9	5	13	3	8	6	4	7
35	Braamsluiper	8	12	5	4	8	8	4	12	8	7	5	3
36	Grasmus	21	15	15	15	10	14	9	12	14	8	6	3
37	Tuinfluit	8	5	10	6	6	7	6	5	8	4	4	3
38	Zwartkop	13	11	16	17	15	18	18	18	14	12	19	17
39	Tjiftjaf	14	11	10	14	14	15	24	16	15	15	13	9
40	Fitis	77	81	61	59	54	56	56	42	45	28	20	25
41	Staatmees	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1
42	Pimpelmees	2	2	0	1	0	1	1	2	4	2	2	3
43	Koolmees	8	5	3	5	0	1	8	6	3	5	4	8
44	Boomkruiper	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
45	Ekster	5	14	4	5	4	6	5	2	2	2	3	1
46	Zwarte Kraai	2	2	0	2	1	0	1	1	0	2	1	2
47	Gaai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
48	Roodmus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
49	Vink	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
50	Putter	9	7	8	5	3	6	6	6	4	3	4	0
51	Kneu	31	52	15	43	31	32	25	31	20	19	12	14
52	Goudhaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
53	Goudvink	0	4	4	3	1	1	1	3	4	2	3	2
54	Rietgors	6	10	3	11	3	2	3	5	9	7	4	3

Evaluatie:

Het gebied zie je de laatste jaren veranderen aan de buitenkant in het oostelijke gedeelte breiden de schorren zich uit en hoe verder je naar het westen gaat zie je dat er meer zand tegen de duinen komt en de plaat wat hoger komt dus geschikter voor de steltlopers. De zandplaten zijn weer uitgebreid <hoger> en er is een ontwikkeling van nieuwe duinen .

Aan weerszijde van het pad wordt de begroeiing steeds dichter waardoor soorten verdwijnen. Door de aanleg van de 2^e Maasvlakte is het gebied aan de westkant erg druk geworden door de kite-surfers en de honden die daar uitgelaten worden zorgen regelmatig voor verstoring. <zie item gebiedstype>.

Aanbevelingen:

Een mooi rustpunt met uitzicht over de slikken creëren waar voor heen de hut stond alleen iets meer naar binnen en hoger voor een beter uitzicht dat alles voorkomt mogelijk verstoring wat een belangrijk element is in dit gebied. Bij scherm halverwege pad is vorig jaar het riet gemaaid met als gevolg dat er een beter uitzicht naar de slikken is wat een hele verbetering is. Misschien kan dat regelmatig gebeuren om het jaar? De mogelijkheid om water voor het scherm te krijgen zou ideaal zijn.

Dit alles kan volgens ons bijdragen om het gebied nog aantrekkelijker te maken.

Westzijde:

De eerste palen rij vanaf de Lyondell hut weg te halen en te verplaatsen naar de open plekken van de tweede palenrij grenzend aan MV2. om een betere afscheiding te maken gezien de ontwikkelingen wat betreft de kite-surfers .

Het blijft een zeer dynamisch gebied wat aan verandering onderhevig is de duinen op de plaat zijn nagenoeg verdwenen maar aan de zuidkant van de plaat zien we de plaat uitbreiden en hoger worden met lichte duinvorming.

We hebben dit gebied met veel enthousiasme geïnventariseerd .

Henk, Bert

