

**Natuurvereniging Hollandse Delta.**

## ***Broedvogelonderzoek Waternest Goeree***

**Mededelingnummer: 376**



Auteur: Silvia Lievaart en Elly Visser

© KNNV afdeling Hollandse Delta

# *Broedvogelonderzoek maand jaar*

*Locatie – ZHL (of NM)*

***Een publicatie van de Vogelwerkgroep van de  
Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de  
KNNV.***

Mededeling nummer: 376

***Auteur: Silvia Lievaart en Elly Visser***

***Inventarisatie door: Silvia Lievaart en Elly Visser***



Omslagfoto: titel. Fotograaf: naam

Natuurvereniging Hollandse Delta  
een afdeling van de KNNV

secretariaat:

Peter Vermaas

Schudegge 17

3224 BP Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-324058

Email: [secretaris@hollandsedelta.knnv.nl](mailto:secretaris@hollandsedelta.knnv.nl)

INHOUDSOPGAVE

|                                 | pagina |
|---------------------------------|--------|
| Overzicht                       | 2      |
| Hoofdstuk 1 inleiding           | 3      |
| Hoofdstuk 2 gebiedsbeschrijving | 4      |
| Hoofdstuk 3 werkwijze           | 5      |
| bezoeken                        | 5      |
| Hoofdstuk 4 resultaten          | 9      |
| soortenbespreking               | 11     |
| evaluatie                       | 13     |

## HOOFDSTUK 1

### Inleiding.

Na vorig jaar met veel plezier de tellingen op Waternest gedaan te hebben, wilden we ook dit jaar weer op pad in hetzelfde gebied, ook al was het aantal vogels dat we telden niet bepaald spectaculair te noemen.

We schrokken daarom wel toen er eind 2023 een kaalslag plaatsvond in het telgebied. De weinige boompjes die er al stonden waren gekapt en de rietkragen sterk verkleind.

Toch zijn we goedgehumtst aan de tellingen begonnen.

Het resultaat van de tellingen ligt nu voor u.



## HOOFDSTUK 2

### Gebiedsbeschrijving (bron Natuurmonumenten)

#### Info Waternest


Het waternest ligt in een eeuwenoud polderlandschap pal achter de duinen van Goeree. De Polder Oude Oostdijk – waar het waternest onderdeel van is – is ontstaan vóór 1300. De aangrenzende polders zoals de Bokkepolder en Polder Nieuwe Oostdijk zijn in de eeuwen daarna aangelegd.

Het waternest is 4,9 ha groot, verdeeld over drie percelen en niet toegankelijk voor publiek (alleen te beleven vanaf de weg).

De grootste natuurwaarde van het gebiedje zit in de botanische waarde met soorten als rietorchis, brede orchis, moeraszoutgras, aardbeiklaver, zulte en gevleugeld hertshooi. Ook komen er hoge dichtheden dagvlinders en sprinkhanen voor. Voor broedvogels heeft het gebied geen bijzondere waarden. Als weidevogelgebied heeft het minder kansen vanwege de bomen en struiken langs de weg aan de oostzijde.

Het beheer is gericht op een optimale ontwikkeling van vochtige tot natte binnenduinrandgraslanden en dan vooral op flora en vegetatie. Voor het beheer zijn de waterhuishouding en het maaibeheer van groot belang. Begrazing vindt niet plaats. Het gebied wordt vochtig en natgehouden door deels regenwater en deels kwelwater uit de duinen. Dit wordt geregeld door een stuw in het gebied. In 2008 is een herstelplan uitgevoerd om de uitgangssituatie van de bijzondere flora te verbeteren. Hiervoor is een deel van het maaiveld geplagd en is er een sloot gedempt en een stuw geplaatst. Dit heeft geleid tot een hogere botanische diversiteit, vooral in het aantal orchideeën en ratelaars.

Het maaibeheer vindt twee keer per jaar plaats, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. De eerste keer begin juli waarbij alleen de meest productieve delen in het gebied worden gemaaid. De tweede maaibeurt vindt plaats in september.



## HOOFDSTUK 3

### Werkwijze

We hebben ervoor gekozen om samen de tellingen te doen en ook samen de gegevens in te voeren. Natuurlijk alles volgens de laatste SOVON richtlijnen

Deze keer vonden we het toch makkelijker om het op papier te noteren en thuis in te voeren

Naast de mogelijke broedvogels hebben we ook bijzondere waarnemingen gemeld zoals bijv. de zomertortel en de verschillende zoogdieren.

We lopen kruisend door het terrein met daarbij af en toe een ander startpunt.

### Bezoeken

Vrijdag 4 maart

Weer: 4 C° licht bewolkt

Tijd: 6.45 – 8.20 uur

Op stap met Nico want Sil ligt ziek thuis zielig.

De zon is al op, volgende keer misschien iets vroeger gaan.

Ze hebben flink huisgehouden op ons landje, heel veel oud riet is weg evenals alle kleine boompjes en struiken die er vorig jaar stonden.

Een paar andere plekken zijn juist niet gemaaid, daar staat nu oud hoog gras.

We lopen linksom met de klok mee. Het is koud, het water staat bijna overal ongeveer 10 cm hoog. Eigenlijk is het maar een kale boel.

- 4 reeën slaan bij aankomst op de vlucht
- 1 haas komt voorbij
- 2 graspiepers vliegen op uit het hogere drogere gras en blijven een beetje daar boven rondjes vliegen
- 2 wilde eend mannetjes vliegen op uit de sloot en komen we later nog 2 x tegen
- 2 meerkoeten in de sloot
- 1 roodborsttapuit zit te zingen op een paaltje op de oostkant toen we de tweede keer gingen kijken
- Bij de burens zitten de kievit, een tureluur en grauwe ganzen.
- Een fazant, blauwe reiger, witte kwikstaart vliegen over,

Gauw weer naar huis warm worden.

Donderdag 21 maart

Weer: 11 C° licht bewolkt

Tijd: 6.30 - 8.15 uur

Deze keer samen op jacht. De zon is al aardig op weg. Het land is drassig met enkele stukken die echt onder water staan.

Linksom met de klok mee. Het is erg stilletjes. We lopen langzaam het rondje en net als vorige keer, het beginstuk nog een keer.

- 1 ree
- 1 haas en een schedel van een haas
- 1 watersnip vliegt op
- 5 wilde eend, 4 mannetjes en later 1 vrouwtje die opvliegt vanuit de begroeiing
- 2 meerkoeten
- 2 roodborsttapuit
- 1 blauwe reiger

Vrijdag 6 april

Weer: 13 C° helder  
Tijd: 6.40 – 8.20 uur

Aanvankelijk licht bewolkt, al vrij snel opgeklaard. We starten weer aan de zijkant van het waternest. Het is nog steeds erg nat.

Er is zelfs een plas ontstaan waar 2 woerden wegvliegen als we aankomen. Er zitten verder 2 krakeenden en 4 meerkoeten. Ook worden we verwelkomd door een miljoen muggen. Waarvan een flink aantal nog niet ontbeten heeft.

We horen een graspieper, maar die zit waarschijnlijk bij de buren. Als we richting de Oostdijk lopen horen we al snel rietzangers in het gehalveerde oude rietveld. Ook vliegt daar een fazant (man) op.

De eerste pinksterbloemen staan al te bloeien. Ook de witte en paarse bloemen van de smeewortel zijn al te zien. Al doorlopend zien we 2 reeën en 5 woerden. En een prachtige zonsopkomst! Op een grenspaal met het buurlandje zit een roodborsttapuit, even later zien we een vrouwtje ernaast zitten. We vinden in dit deel ook een leeg eendenei. Teruglopend langs het rietveld zien en horen we verschillende rietzangers. We onderscheiden met zekerheid 2 zingende mannetjes.

Bij de buren zien we kieviten, tureluurs, wulpen, de reeën die uit ons gebied weggelopen zijn, en een haas. Boven ons landje vliegt de eerste boerenwaluw en een lepelaar. We horen de zwartkopmeeuw. Vanuit het tweede rietveld lopen 2 andere reeën weg naar de rand van het gebied. We vinden weer een leeg eendenei.

Het kleine rietveldje aan het eind van het Waternest vertoont nog geen teken van leven. Ondertussen is de zon op en belooft het een mooie, warme dag te worden.

- 2 ree
- 2 krakeend
- 5 wilde eend, allemaal woerden
- 4 meerkoeten
- 2 roodborsttapuit
- 2 rietzanger
- 1 fazant
- 2 leeggegeten eendeneieren

Zondag 21 april

Weer: 12 C° regen  
Tijd: 19.00 – 20.10

Het was de bedoeling om vrijdagochtend te gaan maar heel slecht weer, storm, regen en erg koud. 'Verschoven naar zondagochtend maar nog wat wankelend in de badkamer besloten we na telefonisch overleg om niet te gaan want ook nu niets dan buien. Dan maar vanavond.

Uiteindelijk met een laat zonnetje hoopvol op stap maar eenmaal gearriveerd in het gebiedje begon het weer lekker en stevig te regenen.

Er was weinig te horen en nog minder te zien.

Alleen de rietzangers lieten zich even horen en een pimpelmees in de boom in het hoekje.

Geen meerkoet, wilde eend of roodborsttapuit helaas.

Koud en nat gauw naar huis.



Zaterdag 5 mei

Weer:

Tijd: 6.00 – 8.00 uur

Geen verslagje gemaakt helaas.

Zaterdag 18 mei

Temperatuur: 14 C° licht bewolkt, later paar druppeltjes regen

Tijd: 5.25 – 7.20 uur

Terwijl we langsfietsen horen we al een rietzanger. We starten weer aan de zijkant van het gebied en lopen richting het grote rietveld. Het waait een beetje, daardoor niet zoveel muggen. Het gras en riet is alweer enorm gegroeid. Veel pinksterbloemen, ratelaar en orchideeën.

Weinig te horen in ons gebiedje. Als we het rietveld naderen splitsen we op en lopen ieder aan een kant erlangs. Weinig zang te horen, wel wat alarmroepjes.

Soms zien we een rietzanger zich verplaatsen. We tellen in dit gebied in ieder geval op 5 plekken rietzangers. Van hier horen we al de zomertortel maar die zit niet in ons gebied. Er vliegen een paar Kieviten over. Verder geen andere bijzonderheden.

Door het hoge riet was het even zoeken waar de plank voor de oversteek ook alweer lag. Over het slootje, waar ook niets zit, geen eend, geen meerkoet, komen we bij het volgende deel van het gebied. Daar zien en horen we de roodborsttapuit, man en vrouw. Ook zit er in het kleine nieuwe rietgebiedje een rietzanger en er rent een jonge haas voor ons weg.

Teruglopend, weer over de sloot en voorbij het grote rietgebied zien en horen we weer roodborsttapuit man en vrouw en we horen in het kleine oude rietveld een zingende rietzanger. We zien twee prachtige reeën, mooi exemplaar bok en mooie geit.

Het was weer een prachtige verstilte ochtend, maar de score blijft mager.





Donderdag 30 mei

Weer: 15 C° lichtbewolkt, weinig wind  
Tijd: 04.45 – 6.50 uur

Alleen op stap want Elly is op vakantie.

Tijdens het fietsritje naar het Waternest ruim voor zonsopkomst, waren er al behoorlijk wat vogels wakker. Bij het Waternest aangekomen is alles nog in diepe rust.

Na een tijdje kijken en luisteren ga ik linksaf op weg, me een weg banend door het hoog opgeschoten gras. Aan het eind van het veld hoor ik, kortstondig, een eerste teken van leven rietzanger. Er vliegen wat grauwe ganzen over. `

Waar we de andere keren regelmatig een roodborsttapuit tegenkwamen zie en hoor ik nu niks.

Mijn weg vervolgend richting het grote rietveld hoor ik een fazant. Het wordt steeds moeilijker begaanbaar. Veel water en erg hoog riet.

Ik keer om voordat ik het bruggetje bereikt heb dat is niet meer te doen. In het rietveld hoor ik op 3 plekken rietzangers. De sloot die het waternest in tweeën deelt is ver buiten zijn oevers getreden. Geen meerkoet, gans of wilde eend te bekennen. Wel duizenden muggen.

In het tweede deel is het akelig stil. Geen rietzanger, geen roodborsttapuit.

Op de terugweg hoor of zie ik ook niets, op de opdringerige muggen na.

Misschien de volgende keer toch maar weer later op pad gaan?

Woensdag 12 juni

Weer: 14 C° weinig wind, grotendeels bewolkt  
Tijd: 19.30 – 21.30,

Deze keer proberen we het maar eens wat later maar ook nu horen en zien we niet heel veel.

Het water is weliswaar gezakt, maar het gras en riet staan er manshoog bij. Lastig om door te komen.

We horen en zien 4x rietzanger, 1x roodborsttapuit.

Ook horen we een jonge meerkoet en een fazant.

We komen een mooie ree tegen en honderden orchideeën !

## HOOFDSTUK 4

Resultaten

## Soorten in gebied Waternest 2024

| soort                           | 8<br>mrt<br>6.45-<br>8.15 | 21<br>mrt<br>6.30-<br>8.15 | 6<br>apr<br>6.30-<br>8.15 | 21<br>apr<br>19.00-<br>20.10 | 5<br>mei<br>6.00-<br>8.00 | 18<br>mei<br>5.15-<br>7.00 | 30<br>mei<br>5.05-<br>5.40 | 12<br>juni<br>19.30-<br>21.30 | aant<br>waar<br>ne<br>min<br>gen | hoog<br>ste<br>broed<br>code | auto<br>clus<br>ter<br>terr |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| wilde<br>eend                   | 1                         | 3                          | 1                         |                              |                           |                            |                            |                               | 5                                | 1                            | 1                           |
| krakeend                        |                           |                            | 1                         |                              |                           |                            |                            |                               | 1                                | 3                            |                             |
| fazant                          |                           |                            | 1                         |                              | 1                         |                            |                            | 1                             | 2                                | 7                            | 1                           |
| meerkoet                        | 1                         | 1                          | 2                         |                              | 1                         |                            |                            | 1                             | 6                                | 12                           | 1                           |
| roodborst<br>tapuit             | 1                         | 2                          | 1                         |                              | 1                         | 2                          |                            | 1                             | 8                                | 7                            | 3                           |
| rietzanger                      |                           |                            | 2                         | 3                            | 6                         | 6                          | 4                          | 4                             | 25                               | 7                            | 6                           |
| pimpel<br>mees                  |                           |                            |                           | 1                            |                           |                            |                            |                               | 1                                | 7                            | 1                           |
| gras<br>pieper                  | 1                         |                            |                           |                              |                           |                            |                            |                               | 1                                | 3                            |                             |
| watersnip                       |                           | 1                          |                           |                              |                           |                            |                            |                               | 1                                | 1                            |                             |
| <b>buiten<br/>de<br/>grens:</b> |                           |                            |                           |                              |                           |                            |                            |                               |                                  |                              |                             |
| <i>nachte<br/>gaal</i>          |                           |                            |                           |                              | 1                         |                            |                            |                               |                                  | 2                            |                             |
| <i>zomer<br/>tortel</i>         |                           |                            |                           |                              | 2                         |                            |                            |                               |                                  | 2                            |                             |



## Vergelijking 2018-2023 -2024

| soort                             | totaal aantal waarnemingen |      |      | hoogste broedcode |      |      | aantal autocluster territoria |       |      |
|-----------------------------------|----------------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------------------|-------|------|
|                                   | 2018                       | 2023 | 2024 | 2018              | 2023 | 2024 | 2018                          | 2023  | 2024 |
| gr canadese gans                  |                            | 2    |      |                   | 15   |      |                               | 1     |      |
| krakeend                          |                            |      | 1    |                   |      | 3    |                               |       |      |
| wilde eend                        | 1                          | 6    | 5    | 15                | 3    | 1    | 1                             | 1     | 1    |
| fazant                            |                            | 4    | 2    |                   | 3    | 7    |                               | 1     | 1    |
| meerkoet                          |                            | 3    | 6    |                   | 1    | 12   |                               |       | 1    |
| watersnip                         |                            |      | 1    |                   |      | 1    |                               |       |      |
| graspieper                        | 4                          |      | 1    | 6                 |      | 3    | 1                             |       |      |
| roodborsttapuit                   |                            | 12   | 8    |                   | 12   | 7    |                               | 2     | 3    |
| rietzanger                        | 3                          | 14   | 25   | 6                 | 14   | 7    | 3                             | 12    | 9    |
| pimpelmees                        |                            |      | 1    |                   |      | 7    |                               |       | 1(?) |
| bosrietzanger                     | 1                          | 2    |      | 6                 | 2    |      | 1                             | 2 (?) |      |
| sprinkhaanzanger                  |                            | 1    |      |                   | 2    |      |                               | 1 (?) |      |
| kleine karekiet                   | 1                          |      |      | 6                 |      |      | 1                             |       |      |
| rietgors                          | 2                          |      |      | 6                 |      |      | 1                             |       |      |
| buiten de grens van t waternest : |                            |      |      |                   |      |      |                               |       |      |
| zwartkop                          |                            | 1    |      |                   | 2    |      |                               | 1 (?) |      |
| koekoek                           |                            |      |      |                   | 2    | 2    |                               |       |      |
| zomertortel                       |                            |      |      |                   | 2    | 2    |                               |       |      |
| nachtegaal                        |                            |      |      |                   |      |      |                               |       |      |
| houtsnip                          |                            | 1    |      |                   |      |      |                               |       |      |
| Overige soorten                   |                            |      |      |                   |      |      |                               |       |      |
| haas                              |                            | 2    | 4    |                   |      |      |                               |       |      |
| ree                               |                            | 8    | 11   |                   |      |      |                               |       |      |

In 2018 is het gebiedje door iemand anders geïnventariseerd. Voor een zo compleet mogelijk beeld zijn ook deze resultaten toegevoegd.

Het aantal jaren dat er BMP tellingen in dit gebiedje zijn geweest is te weinig om duidelijke conclusies te trekken. Het schema spreekt voorlopig voor zich. De vraagtekens bij enkele territoria geven aan dat we dit niet helemaal begrijpen omdat het op basis van één enkele waarneming is.

## Soortenbespreking

van enkele vaste bezoekers van het Waternest

### Rietzanger


De rietzanger is een geelbruine vogel met een opvallende lichte wenkbrauwstreep en donker gestreepte kop en rug. De zang lijkt op die van de kleine karekiet, maar is sneller, met meer wisselende ritmes, zonder duidelijke pauzes, "drumstelletje". Niet de schorre klanken van de karekiet, maar fluittoontjes tussendoor. De rietzanger staat op de rode lijst. Volgens SOVON wordt de broedpopulatie geschat op 33.000-41.000 (2018-2020). De laatste jaren is er gelukkig een significante toename van het aantal broedgevallen. De rietzanger is een trekvogel en overwintert ten zuiden van de Sahel. Onze broedaantallen zijn daarom ook mede afhankelijk van de omstandigheden daar.

Rietzangers zijn in ons land aanwezig van eind maart tot begin oktober. In West- en Noord-Nederland komt de rietzanger veel voor in moerasachtige gebieden en rietlanden, ook langs sloten. De ideale leefomgeving is een combinatie van jong en overjarig riet en een dichte kruid laag. Het nest bevindt zich laag in het riet. De mannetjes klimmen tot bovenin de rietstengels en voeren daarvandaan korte zangvluchten uit. Ze zijn dan goed waar te nemen.

De broedperiode ligt tussen eind april en begin juni. Een tot twee broedsels per seizoen, met 4-7 eieren die in 13 tot 15 dagen uitgebroed worden. Beide ouders voeren de jongen, met insecten. De jongen zitten 10-13 dagen op het nest en zijn 3 weken na uitvliegen zelfstandig.

### Roodborsttapuit

De roodborst tapuit is een opvallende vogel. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een oranje borst. Vrouwtjes hebben bruin gestreepte bovendelen en twee witte vlekken op de boven vleugel. Mannetjes hebben dat ook, maar die hebben een witte stuitvlek en -halszijden en een zwarte kop. De zang is kort en helder, vaak gecombineerd met de 'ketsende kiezelsteentjes' van de roep.



Ook de roodborsttapuit staat op de rode lijst.

Broedpopulatie wordt geschat op 18.000-22.000 (2018-2020). Ook bij de roodborsttapuit is er de laatste jaren een significantie toename van het aantal broedgevallen. Zij brengen de winter door in Zuid-Europa. Vanaf februari kunnen de eerste vogels weer in ons land gezien worden, vanaf september/oktober trekken de meesten weer zuidwaarts. Bij zachte winters blijven een aantal roodborsttapuiten in Nederland.

Roodborsttapuiten broeden op hoger gelegen zandgronden, maar ook langs de kust, van de roodborsttapuiten broeden op hoger gelegen zandgronden, maar ook langs de kust, van de wadden tot de Zeeuwse delta. Zij zoeken hun voedsel en nestgelegenheid in structuurrijke open gebieden, vaak aan de rand van bosachtig gebied. De toppen van bomen of struiken gebruiken ze als uitkijk- en zangpost. Het nest wordt laag bij de grond gemaakt, verscholen in dichte vegetatie. Ze broeden al vanaf maart en hebben soms wel tot 3 legsels per seizoen van 4-6 eieren. De broedduur is 14-15 dagen. De jongen zijn 13-16 dagen op het nest en daarna nog 8-14 dagen afhankelijk van hun ouders. Ze worden gevoerd met insecten, maar ook wormen, rupsen slakken, zaden en bessen.

Meerkoet.

De meerkoet, een tot de rallen behorende watervogel, is een veel voorkomende soort in Nederland. Met name in het westen van het land, in de natte gebieden, maar ook in iedere sloot of vijver in stedelijk gebied zie je ze in grote aantallen. Het is een makkelijk herkenbare vogel, grijszwart gekleurd lijf met zwarte kop en fel contrasterende witte snavel met hoofdtooi. De volwassen exemplaren hebben rode ogen.

Ze zijn jaarrond in ons land aanwezig, maar dat zijn niet perse dezelfde exemplaren: een deel trekt 's winters weg en een deel komt juist hier overwinteren.

Na het broedseizoen ogen ze gemoedelijk en zijn ze vaak in grote aantallen bij elkaar. Tijdens het broedseizoen tonen ze zich van een andere kant; hun territorium verdedigend jagen ze alles om zich heen furieus weg. Ze bouwen dan imposante nesten, daarbij ook gebruik makend van allerlei zwerfafval. Bij Naturalis loopt er een onderzoek naar deze nestbouw.

In het nest worden 5 tot 10 eieren gelegd, die na 21 tot 15 dagen uitgebroed zijn. De jongen worden door beide ouders gevoed en kunnen na 8 weken vliegen. Er zijn per broedseizoen 2 tot 3 broedpogingen.

Meerkoeten zijn omnivoor en leven van o.a. waterplanten, insecten en weekdieren.

Bronnen: Sovon, Vogelbescherming, Veldgids Vogelzang

## Evaluatie.

Vorig jaar was het de eerste keer dat wij op Waternest geteld hebben. De verwachting was toen aanvankelijk meer soorten broedvogels aan te treffen dan we uiteindelijk zagen.

Dit jaar waren onze verwachtingen wat getemperd aangezien de bomen die er in het gebied stonden, en waar wij regelmatig de roodborsttapuiten zagen zitten, verwijderd waren. Alleen aan de zijkant van het gebied stond nog een boom overeind. Ook wat betreft de rest van het gebied waren er veranderingen. Zo was het opschot van kruipwilgen e.d. in het deel gelegen bij de Oostdijk verwijderd en waren de rietvelden ook voor grotere delen gemaaid. Bij navraag bij Natuurmonumenten hoorden wij dat dit beheer een bewuste keus is geweest. Vorig jaar hadden wij al begrepen dat de natuurwaarde van het gebied zit in de botanische waarde, niet zozeer in de waarde voor broedvogels. Ook dit jaar was er inderdaad weer een rijkdom aan planten zoals veel orchideeën, ratelaar, pinksterbloem, smeerwortel etc.

D.m.v. een door een zonnepaneel gestuurde pomp wordt het waterniveau geregeld. Het gebied was ook veel natter dan het jaar ervoor, waarschijnlijk ook mede veroorzaakt door het natte voorjaar. Het vogeltellen werd voor ons nog meer een uitdaging dan vorig jaar, gezien de hoge waterstand en uitbundige groei van het riet.

Wij vragen ons af of het op prijs gesteld wordt om door te gaan met broedvogeltelling in dit gebied. Wijzelf hebben de indruk dat het gezien de duidelijke nadruk op de botanische waarde misschien minder interessant is.

