



KNNV - Afd. Voorne - Vogelwerkgroep



Mededeling no. 169

"Westplaattelling"

2003 - 2007



door Tom van Wanum en Hugo van der Slot

Foto voorblad: Scholekster

Foto's: © Hugo van der Slot

Inhoudsopgave

*Dankzegging

Inleiding

- *Historisch overzicht
- *Westplaat 2003 – 2007
- *Bedreiging en kansen

De telling

- *de telwijze
- *de aantal uitgevoerde tellingen

De beschreven soorten

- *de soorten in grafiek
- *de telling in excel
- *Bijzondere waarnemingen op de westplaat



3 westplaattellers

Dankzegging

Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen 5 jaar weer hebben meegewerkt om de tellingen van de Westplaat rond te krijgen. De aangeleverde gegevens heb ik verwerkt in dit verslag. Door jullie inzet en steun blijft het Westplaat project voortduren.

Historisch overzicht.

De plaats waar nu het vogelrustgebied 'De Westplaat' ligt heeft een bewogen historie. De kust van Voorne heeft in de loop der eeuwen grote veranderingen ondergaan. Wanneer we terug gaan tot in de Romeinse tijd, dan vormt Voorne de zuidelijke oever van het uitgebreide estuarium van de Rijn en de Maas. Door aanslibbing en het ontstaan van zandbanken is rond de Middeleeuwen dit estuarium kleiner geworden. De plaats, grootte en vorm van deze zandbanken blijft zich sterk wijzigen. Door verdergaande aanslibbing en vastgroei van zandbanken aan de Hoek van Holland ontstaat De Beer.

Bij het graven van De Nieuwe Waterweg (1870) raakt De Beer los van 'Holland'. Anderzijds ontstaat door bedijking van de Scheurpolder een verbinding met Rozenburg.

De naam Westplaat verschijnt voor het eerst op de kaart in 1900.

Het is een vrij kleine zandplaat gelegen in de toenmalige mond van de Maas.

Op een kaart van 1935 is de Westplaat meer naar zijn huidige locatie verschoven.

Waren de veranderingen in het gebied tot nu toe vooral het gevolg van natuurlijke oorzaken, de laatste veertig jaar heeft de mens zijn invloed doen gelden. Dit begon in 1950 door sluiting van het Brielse Gat.

Ten noorden van de Westplaat lag de zich steeds uitbreidende zandplaat de Maasvlakte. Hier is in 1962-1964 het havengebied de Maasvlakte tot stand gekomen, wat tevens het einde betekende van het vogeleiland 'De Beer'.

Ook de Westplaat verdween voor het grootste gedeelte.

In 1966 is de dam tussen Maasvlakte en Voorne aangelegd, de zgn. Stuifdijk. (Brielse gatdam)

Na aanleg van de baggerspeciebergings - in gebruik gesteld in 1987- en het op deltahoogte brengen van de zeewering heeft de Westplaat zijn huidige uiterlijk gekregen.

Westplaat 2003 – 2007

De Westplaat is een buitendijks, slikkig gebied. Er is een geul, het Brielse Gat en een zandplaat, de Westplaat.

Het gebied staat in open verbinding met de Noordzee waardoor bij opkomend water de lagere delen via het Brielse Gat onderlopen.

Alleen bij zeer hoog water lopen de hogere delen van de Westplaat onder. Regelmatig is er aanspoeling van Zeesla (*Ulva lactuca*), soms tot een dikte van wel 10 centimeter. Door de getijdenwerking vindt er afzetting van slib plaats en er ontstaan overgangen tussen zout en zoet.

Hierdoor is er een doorlopende verandering van het gebied wat tot uitdrukking komt in de vegetatie.

Sinds 1987 is de door de plantenwerkgroep KNNV Voorne regelmatig vegetatie onderzoek verricht.

De zijde ten zuiden van het Brielse Gat kenmerkt zich door de vorming van stuifduintjes met Biestarwegras (*Elytrigia junceaformis*) en pioniers als Zeekraal (*Salicornia europaea*) en Schorrekruid (*Suaeda maritima*). Aan de zijde van de Brielse Gatdam, de stuifdijk, is Helm (*Ammophila arenaria*) ingeplant.

Aan de Westplaatzijde heeft een snelle successie plaatsgevonden en is de pioniersvegetatie steeds meer naar de waterzijde verdrongen. Richting duinenrij hebben Zeebies (*Scirpus maritimus*) en Mattebies (*Scirpus lacustris*) zich sterk ontwikkeld. Tussen de rij aan de duinzijde geplante Witte Abeel (*Populus alba*), Geoorde Wilg (*Salix aurita*), Duindoorn (*Hippophae rhamnoides*) en de Matte- en Zeebieszone ligt een vochtige strook.



Tom van Wanum tijdens één van de tellingen.

Bedreigingen en kansen.

De aanleg van de Tweede Maasvlakte moet als een bedreiging worden gezien voor de Westplaat. De invloed van de getijdenwerking zal, door de ligging van de Tweede Maasvlakte, sterk afnemen. Daardoor zal er steeds meer zeeafval achterblijven en krijgen Duindoorn en Wilg meer de gelegenheid door te groeien.

De populariteit van het kitesurfen neemt sterk toe. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet dat steeds meer kitesurfers door het beschermde gebied varen en de daar aanwezige vogels verstoren. De grens tussen recreatiegebied en beschermd natuurgebied wordt ook steeds vaker door andere recreanten overschreden.

Kansen zijn er gelukkig ook. Door het sluiten van het autostrand neemt de druk op het gebied af.

Pioniersduintjes zijn zich al aan het vormen.


Door de kennistoename en de optische middelen zijn we nu beter in staat een beeld te geven van de huidige situatie. Het blijft daardoor extra interessant om te blijven onderzoeken wat er gebeurt op en met de Westplaat.

De zonering van de Westplaat

Om de altijd tegenstrijdige belangen van recreatie en natuurontwikkeling in goede banen te leiden is er besloten het gebied in zones te verdelen.

Zone I beslaat het grootste deel van de Westplaat en is ingesteld als vogelrustgebied. In dit gebied is geen enkele vorm van recreatie toegestaan.

Zone III is het recreatiegebied. Deze zone is alleen te bereiken via het pad langs de duinrand en binnen dit gebied zijn alle vormen van recreatie toegestaan. Daarnaast is er ook nog een zone waar beperkte recreatie mogelijk is, Zone II.



Op zich is het instellen van gebieden voor de verschillende gebruikers een logische maar zo'n zonering eist handhaving. Het is een illusie dat borden met "verboden toegang" voldoende zijn om te voorkomen dat vogels in Zone I verstoord worden.

Zo worden er regelmatig loslopende honden gezien in het noordoostelijke deel van het vogelrustgebied. De vogels in Zone I langs Zone III worden regelmatig verstoord door de kitesurfers in dit gebied. In de praktijk betekent dat dus dat de beschikbare ruimte van Zone I voor foeragerende en rustende vogels in werkelijkheid kleiner is dan op de kaart is aangegeven, ze verplaatsten zich in noordwestelijke richting.

Zone II is een zone met gemengd gebruik. Zo mogen er wel loslopende honden en surfers in dit gebied terwijl het niet toegankelijk is voor ruiters.

Surfers zullen van deze zonering geen gebruik maken omdat het niet is toegestaan het water op te gaan, dit valt namelijk in Zone I. Nu zijn er plannen om aan Zone II een zogenaamde wegvaarzone te situeren. Vanuit deze zone is het dan mogelijk het open water in Zone III te bereiken zodat men minder ver te hoeft lopen.

In deze Zone II bevindt zich een schelpenbank die vrijwel nooit meer onder water staat en dit is een aantrekkelijke plaats voor de surfers om op hun plank te stappen en richting Zone III te varen.

Uit natuurontwikkelings oogpunt echter is deze schelpenbank ook belangrijk. Deze plek biedt mogelijkheden aan broedende (Kleine) plevieren en sterns. Ook de rustende vogels in de biezen en de krekken voor de wegvaarzone zullen worden verstoord door surfers.

Kortom bij het instellen van deze wegvaarzone is vooral rekening gehouden met de recreanten en niet met de vogels.

Daarbij komt ook nog dat het met deze 3 zones wel erg ingewikkeld voor de gemiddelde gebruiker.

Wie weet nu straks nog waar je wel je hond mag loslaten of mag surfen? Ook de gebruiker die de regels aan de laars lapt wordt eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. Door het hele gebied, inclusief Zone I, kunnen sporen worden aangetroffen van crossers en andere voertuigen.

Het instellen van een zonering vereist het naleven van de regelgeving en moet desnoods door handhaving worden afgedwongen!

De Tellingen

de telwijze

Het tellen van de Westplaat gebeurt door vrijwilligers.

Tijdens de vergaderingen van de Vogelwerkgroep wordt er een rooster opgesteld en afspraken gemaakt over de aanvangstijd van de tellingen.

Doordat er door vrijwilligers geteld wordt die uiteraard niet allemaal hetzelfde kennisniveau bezitten kan het gebeuren dat er soorten niet opgemerkt worden, het zal dan vooral gaan om de niet regelmatig voorkomende soorten. Dat is uiteraard jammer maar voor een overzicht van de belangrijkheid van de Westplaat voor de vogels is dit geen probleem.

Er wordt 's ochtends gestart kort na zonsopgang, dus op een tijdstip dat er nog weinig of geen dagjesmensen in het gebied zijn. Enerzijds omdat de verstoring die recreanten teweeg brengen de telling kunnen beïnvloeden, anderzijds omdat er in het afgesloten gebied geteld wordt en we anderen niet op de gedachte willen brengen dit gebied ook te betreden.

Wat wel van invloed is op de tellingen is de manier waarop de route gelopen wordt.

Ruwweg wordt de volgende route gelopen:

Gestart wordt aan de zuidwest kant van de Brielsegatdam, er wordt dan in westelijke richting gelopen tot de kreek, vervolgens wordt de waterlijn gevolgd eerst in richting noordoost en later in noordwestelijke richting. Via de zuidzijde van de Westplaat- bosjes wordt er verder geteld tot de vogelkijkhut "De Bonte Piet". De terugweg loopt via het wandelpad en de Brielsegatdam.

Ondanks dat men dus ongeveer dezelfde route loopt kunnen er toch flinke verschillen optreden.

Zo lopen sommige tellers eerst door de lage begroeiing en anderen doen dat niet. Op de terugweg kan er zowel bovenop de Brielsegatdam worden gelopen, waarbij ook de vogels die zich hier in de duindoorns ophouden worden geteld maar men kan ook besluiten beneden te blijven waardoor deze vogels worden gemist.

Het niet doorkruisen van de lage begroeiing bij het vertrekpunt is van invloed op de aantallen graspiepers, watersnippen en bokjes die geteld worden, deze houden zich vooral hier op en als dit gebied pas aan het eind van de telling wordt meegenomen zijn door verstoringen deze vogels al verdwenen en worden dus niet meer geteld.

In de toekomst zou een standaardisering van starttijd en de te lopen route overwogen kunnen worden omdat een uniforme manier van telling van belang is.

Een andere factor die van grote invloed is op de aantallen vogels dat tijdens een telling geteld wordt is het getijde. Bij hoogwater zullen er minder steltlopers foerageren op de slikken. Verwacht mag worden dat door de lange reeks van tellingen uitschieters (zowel naar boven als naar beneden) veroorzaakt door het getijde zijn afgevlakt.

Verder is er in de afgelopen jaren de kennis bij vogelaars toegenomen en het feit dat nu elke telling gebeurt met (goede) telescopen zal zeker bijgedragen hebben tot het waarnemen van schaarse soorten. Echter op de waarnemingen van de meest voorkomende soorten zal dit van weinig invloed geweest zijn.

Bij het inventariseren van vogels op de Westplaat zou men er eigenlijk van uit moeten gaan dat alleen vogels worden geteld die een binding (voedselzoekend, rusten, broeden) met de Westplaat hebben, dit is echter niet het geval. Overvliegende vogels worden ook geteld en een deel hiervan heeft geen relatie met het gebied, denk hierbij bijvoorbeeld aan doortrekkende soorten.

Het aantal uitgevoerde tellingen en de resultaten

De tellingen in de periode 2003 – 2007 hebben zoals gewoonlijk maandelijks plaatsgevonden en zijn elke maand trouw uitgevoerd, wat dus neerkomt op 60 tellingen.

Het aantal soorten dat tijdens de tellingen van 2003 - 2007 op de Westplaat is waargenomen is het mooie aantal van 175 soorten

De soortbeschrijving

Een keuze maken in de grote hoeveelheid op de Westplaat geziene soorten is niet makkelijk. Iedere vogelaar, en dus ook de teller, is snel geneigd de zeldzame of schaarse soorten in de lijsten op te nemen. Dit zijn immers de waarnemingen die als krenten in de pap zijn.

Echter, dit soort waarnemingen zeggen helemaal niets over de geschiktheid van het gebied voor vogels laat staan over de ontwikkeling er van. Deze zeldzaamheden kunnen overal te pas en te onpas opduiken en hebben in het algemeen geen enkele relatie met het gebied.

Deze zogenaamde "chocolade soorten" zijn apart vermeld en kunnen als stimulans dienen om de Westplaat vaker te bezoeken, het treffen van een schaarse soort is altijd mogelijk!

De soorten die we hebben beschreven zijn soorten die regelmatig en soms gedurende langere tijd op de Westplaat te vinden zijn en er dus wel degelijk een relatie mee hebben.

Ook hebben wij mee laten spelen de status die sommige vogels hebben als het gaat om bedreigde en kwetsbare soorten.

We hebben hiervoor de "Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland" van Osieck & Hustings (1994) gebruikt. De Rode Lijst zoals gepubliceerd in de Staatscourant wijkt op details hiervan af.

De samenstelling van deze lijst is gebaseerd op 6 motieven:

Motief A (Internationale betekenis) Vogelsoorten die op wereldschaal bedreigd zijn en in Nederland als broedvogel voorkomen en vogelsoorten met een overwegend Europese verspreiding waarvan minstens een kwart van de Noordwest-Europese populatie in Nederland broedt

Motief B (Sterk bedreigd) Vogelsoorten met een geringe landelijke verspreiding die met meer dan de helft in aantal zijn achteruitgegaan

Motief C (Bedreigd) Vogelsoorten met een geringe tot ruime landelijke verspreiding waarvan het aantal in recente tijd duidelijk tot sterk is achteruitgegaan als soorten met een ruime landelijke verspreiding en een landelijke broedpopulatie van minder dan 100.000 paren waarvan het aantal in recente tijd sterk is achteruitgegaan


Motief D (Kwetsbaar) Vogelsoorten die gebonden zijn aan een voor Nederland karakteristiek biotoop waarvan het voorkomen kwetsbaar is (<1000 broedpaar, geringe verspreiding), en soorten waarvan minstens 67% van de landelijke populatie in drie of minder gebieden is geconcentreerd

Motief E (Verdwenen) Vogelsoorten die sinds 1950 (bijna) als broedvogel uit ons land verdwenen zijn


Motief F (Internationale betekenis) Soorten die op wereldschaal bedreigd zijn, en soorten met een overwegend West- Palearctische verspreiding waarvan minstens een kwart van de Noordwest-Europese populatie of de Oost- Atlantische trekwegpopulatie in Nederland voorkomt

De soortbeschrijving is achterwegen gelaten omdat er geen noemenswaardige veranderingen zijn opgetreden t.o.v. het 25 jarig rapport van 2002. De jaarlijkse aanwezigheid van de soorten is via een grafiek weergegeven.


Fuut (*Podiceps cristatus*)




Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*)




Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*)




Lepelaar (*Platalea leucorodia*)




Grauwe gans (*Anser anser*)




Bergeend (*Tadorna tadorna*)




Smient (*Anas penelope*)




Wintertaling (*Anas crecca*)




Wilde eend (*Anas platyrhynchos*)




Pijlstaart (*Anas acuta*)




Eidereend (*Somateria mollissima*)




Brilduiker (*Bucephala clangula*)




Middelste Zaagbek (*Mergus serrator*)




Scholekster (*Haematopus ostralegus*)




Kluut (*Recurvirostra avosetta*)




Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*)




Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*)




Kanoetstrandloper (*Calidris canutus/Islandia*)




Drieteenstrandloper (*Calidris alba*)




Bonte strandloper (*Calidris alpina/artica/schinzii*)




Watersnip (*Gallinago gallinago*)




Rosse grutto (*Limosa lapponica*)




Wulp (*Numenius arquata*)




Tureluur (*Tringa totanus*)




Kokmeeuw (*Larus ridibundus*)




Stormmeeuw (*Larus canus*)




Kleine mantelmeeuw (*Larus fuscus*)




Zilvermeeuw (*Larus argentatus*)




Grote mantelmeeuw (*Larus marinus*)




Grote stern (*Sterna sandvicensis*)




Visdief (*Sterna hirundo*)




Graspieper (*Anthus pratensis*)




Blauwborst (*Luscinia svecica*)




Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*)




Braamsluiper (*Sylvia curruca*)




Grasmus (*Sylvia communis*)




Zwartkop (*Sylvia atricapilla*)




Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*)




Fitis (*Phylloscopus trochilus*)



Ekster (*Pica pica*)



Rietgors (*Emberiza schoeniclus*)




		2003	2004	2005	2006	2007	totaal
20	Roodkeelduiker	0	0	0	1	0	1
70	Dodaars	0	2	0	0	3	5
90	Fuut	123	117	72	196	114	622
100	Roodhalsfuut	0	0	1	0	0	1
110	Kuifduiker	6	2	9	0	4	21
120	Geoorde Fuut	1	0	0	0	0	1
710	Jan van Gent	0	0	2	0	0	2
720	Aalscholver	904	983	768	935	332	3922
800	Kuifaalscholver	0	0	1	0	0	1
1190	Kleine Zilverreiger	5	2	7	8	4	26
1210	Grote zilverreiger	0	0	0	1	1	2
1220	Blauwe Reiger	105	32	65	37	76	315
1240	Purperreiger	0	0	0	1	0	1
1440	Lepelaar	187	176	88	106	87	644
1470	Flamingo	2	3	0	0	0	5
1520	Knobbelzwaan	8	2	7	9	4	30
1540	Wilde Zwaan	24	0	0	0	2	26
1590	Kolgans	23	0	64	10	16	113
1610	Grauwe Gans	490	827	575	491	1159	3542
1660	Canadese Gans	2	0	28	3	2	35
1670	Brandgans	71	74	80	0	3	228
1680	Rotgans	24	105	48	183	117	477
1700	Nijlgans	32	8	9	9	39	97
1730	Bergeend	1910	1980	1544	1483	1136	8053
1790	Smient	281	540	580	1620	991	4012
1820	Krakeend	3	7	7	21	90	128
1840	Wintertaling	228	13	96	51	20	408
1860	Wilde Eend	1397	1153	943	791	875	5159
1890	Pijlstaart	1631	892	983	1340	1039	5885
1940	Slobeend	130	0	2	20	18	170
1980	Tafeleend	381	11	0	0	12	404
2030	Kuifeend	1	0	1	2	0	4
2060	Eidereend	383	25	38	228	104	778
2130	Zwarte Zeeëend	0	1	0	0	0	1
2180	Brilduiker	425	579	52	80	160	1296
2200	Nonnetje	1	0	0	0	0	1
2210	Middelste Zaagbek	278	173	283	240	182	1156
2600	Bruine Kiekendief	11	12	12	14	10	59
2610	Blauwe Kiekendief	4	3	3	5	0	15
2670	Havik	4	2	7	6	3	22
2690	Sperwer	8	4	11	9	2	34
2870	Buizerd	17	10	15	18	7	67
2900	Ruigpootbuizerd	2	0	0	1	0	3
3010	Visarend	1	0	0	3	0	4
3040	Torenvalk	5	2	6	9	8	30
3090	Smelleken	0	1	0	0	0	1
3100	Boomvalk	0	2	0	1	1	4
3200	Slechtvalk	4	5	4	7	9	29
3700	Kwartel	0	0	1	0	0	1
3940	Fazant	35	27	22	21	26	131
4070	Waterral	1	2	2	2	4	11
4290	Meerkoet	7	11	7	4	9	38
4500	Scholekster	16627	18118	22306	15295	16817	89163
4560	Kluut	801	758	394	433	187	2573

		2003	2004	2005	2006	2007	totaal
4560	Tureluur	2662	2421	2580	1798	1337	10798
4690	Kleine Plevier	2	2	1	3	3	11
4700	Bontbekplevier	259	803	683	1610	596	3951
4770	Strandplevier	1	5	0	0	0	6
4850	Goudplevier	36	54	59	3	1	153
4860	Zilverplevier	819	1075	2023	2841	1747	8505
4930	Kievit	76	134	5	126	39	380
4960	Kanoetstrandloper	172	76	2061	872	771	3952
4970	Drieteenstrandloper	970	3156	2003	2956	4245	13330
5010	Kleine Strandloper	0	1	0	0	5	6
5090	Krombekstrandloper	0	0	0	0	2	2
5120	Bonte Strandloper	3378	2935	3680	3394	3350	16737
5170	Kemphaan	2	0	0	0	0	2
5180	Bokje	15	14	7	16	21	73
5190	Watersnip	93	96	87	189	229	694
5290	Houtsnip	0	0	0	1	0	1
5320	Grutto	0	36	0	5	2	43
5340	Rosse Grutto	749	2579	1420	2322	1260	8330
5380	Regenwulp	40	28	19	48	15	150
5410	Wulp	9801	6194	7316	9830	8516	41657
5450	Zwarte Ruiter	3	7	1	11	3	25
5480	Groenpootruiter	50	59	63	68	32	272
5530	Witgatje	2	0	1	9	3	15
5560	Oeverloper	2	2	5	5	2	16
5610	Steenloper	38	13	11	16	6	84
5660	Middelste Jager	0	1	0	0	0	1
5670	Kleine Jager	2	0	0	0	0	2
5750	Zwartkopmeeuw	1	1	4	2	9	17
5780	Dwergmeeuw	0	0	4	4	0	8
5820	Kokmeeuw	10046	7484	3621	4349	4648	30148
5900	Stormmeeuw	76	155	218	83	97	629
5910	Kleine Mantelmeeuw	26	3	17	12	14	72
5920	Zilvermeeuw	466	1564	1220	501	1287	5038
5925	Pontische meeuw	0	0	1	0	0	1
5990	Grote burgemeester	0	0	0	0	1	1
6000	Grote Mantelmeeuw	308	366	295	96	78	1143
6110	Grote Stern	38	17	240	69	34	398
6150	Visdief	88	50	339	109	108	694
6240	Dwergstern	0	0	0	3	0	3
6270	Zwarte Stern	0	0	3	4	0	7
6340	Zeekoet	0	0	1	0	0	1
6680	Holeduif	21	10	7	9	6	53
6700	Houtduif	13	2	12	24	1	52
6840	Turkse Tortel	0	3	2	2	0	7
6870	Tortel	2	5	3	0	3	13
7240	Koekoek	2	1	1	1	0	5
7670	Ransuil	0	0	1	0	0	1
7680	Velduil	6	0	1	2	0	9
7950	Gierzwaluw	5	0	15	11	66	97
8560	Groene Specht	1	0	1	1	0	3
8760	Grote Bonte Specht	2	0	2	4	0	8
9740	Boomleeuwerik	8	0	0	0	0	8
9760	Veldleeuwerik	102	37	65	68	21	293
9780	Strandleeuwerik	0	0	0	0	9	9

		2003	2004	2005	2006	2007	totaal
9810	Oeverzwaluw	1	0	4	20	35	60
9920	Boerenzwaluw	7	3	14	17	7	48
10090	Boompieper	0	0	1	4	1	6
10110	Graspieper	268	344	297	416	282	1607
10120	Roodkeelpieper	2	0	0	0	0	2
10143	Oeverpieper	0	10	0	27	32	69
10170	Gele Kwikstaart s.l.	1	0	0	2	2	5
10172	Engelse Gele Kwikstaart	0	0	0	3	0	3
10173	Noordse gele kwikstaart	1	0	0	0	0	1
10190	Grote Gele Kwikstaart	2	0	3	1	4	10
10200	Witte Kwikstaart s.l.	15	6	38	37	26	122
10660	Winterkoning	37	19	29	29	22	136
10840	Heggenmus	55	36	29	65	39	224
10990	Roodborst	12	10	16	18	14	70
11040	Nachtegaal	5	3	5	12	7	32
11060	Blauwborst	15	13	10	10	10	58
11210	Zwarte Roodstaart	0	1	0	0	0	1
11370	Paapje	1	0	2	8	0	11
11390	Roodborsttapuit	20	14	10	16	8	68
11460	Tapuit	7	5	11	2	9	34
11860	Beflijster	2	0	4	0	5	11
11870	Merel	20	18	38	35	25	136
11980	Kramsvogel	267	362	62	190	20	901
12000	Zanglijster	156	0	42	7	16	221
12010	Koperwiek	127	12	150	3	6	298
12020	Grote Lijster	1	0	0	0	1	2
12360	Sprinkhaanzanger	3	1	4	5	10	23
12430	Rietzanger	1	0	1	3	1	6
12500	Bosrietzanger	0	2	0	1	0	3
12510	Kleine Karekiet	4	3	3	7	5	22
12590	Spotvogel	0	0	1	0	1	2
12740	Braamsluiper	4	4	7	7	10	32
12750	Grasmus	12	13	10	11	4	50
12760	Tuinfluit	0	7	2	4	2	15
12770	Zwartkop	8	1	45	22	10	86
13110	Tijftjaf	25	20	15	23	21	104
13120	Fitis	65	33	47	59	62	266
13140	Goudhaantje	10	0	29	3	2	44
13150	Vuurgoudhaantje	2	1	0	1	6	10
13350	Grauwe Vliegenvanger	0	0	0	1	0	1
13640	Baardmannetje	15	0	1	0	0	16
14370	Staartmees	3	0	2	4	6	15
14610	Zwarte mees	0	0	0	0	2	2
14620	Pimpelmees	16	10	3	21	65	115
14640	Koolmees	33	8	37	19	14	111
15200	Klaapekster	0	0	0	0	1	1
15390	Vlaamse Gaai	2	0	0	0	1	3
15490	Ekster	124	121	71	71	35	422
15600	Kauw	153	1	292	11	4	461
15671	Zwarte Kraai	116	127	135	184	219	781
15820	Spreeuw	1788	3878	2454	56230	866	65216
15980	Ringmus	4	0	0	0	13	17
16360	Vink	764	100	223	99	36	1222
16380	Keep	352	59	41	5	6	463

		2003	2004	2005	2006	2007	totaal
16490	Groenling	13	5	3	21	22	64
16530	Putter	1	0	3	10	24	38
16540	Sijs	21	0	22	0	15	58
16600	Kneu	214	260	196	150	160	980
16620	Frater	40	0	0	11	0	51
16630	Barmsijs	28	0	1	0	0	29
17100	Goudvink	3	1	11	4	7	26
18470	IJsgors	2	0	1	0	0	3
18500	Sneeuwgors	0	8	0	1	33	42
18660	Ortolaan	0	0	0	1	0	1
18770	Rietgors	63	23	35	42	35	198
20100	Soepeend	10	0	3	2	1	16
	Zwarte Zwaan	0	0	2	0	0	2
	bruine rat	0	0	1	0	0	1
	Bruinvis (dood)	0	0	0	1	0	1
	Haas	0	0	17	25	18	60
	Konijn	0	0	5	9	5	19
	Noordse woelmuis	0	0	0	1	0	1
	ree	0	1	2	0	1	4
	Zeehond	0	0	57	86	71	214
	Bruine kikker						
		67896	67608	67803	119144	54510	376961
		140	115	135	136	133	175



Rustende Kanoeten en Bonte strandlopers op de Westplaat

Bijzondere en leuke waarnemingen van de Westplaat

Het volgende lijstje geeft de leuke en bijzondere soorten weer van de periode 2003 - 2007

Geoorde fuut	2003
Kemphaan	2003
Kleine jager	2003
Nonnetje	2003
Noordse gele kwikstaart	2003
Middelste jager	2004
Zwarte roodstaart	2004
Zwarte zee-eend	2004
Jan van Gent	2005
Kuif aalscholver	2005
Kwartel	2005
Pontische meeuw	2005
Ransuil	2005
Roodhalsfuut	2005
Zeekoet	2005
Zwarte zwaan	2005
Houtsnip	2006
Purperreiger	2006
Roodkeelduiker	2006
Grote burgemeester	2007
Klapekster	2007
Krombekstrandloper	2007
Grote zilverreiger	2006 en 2007



Grote burgemeester

De volgende foto's zijn gemaakt op de westplaat, het gaat hier om een waarschijnlijke kruising tussen een Giervalk X Sakervalk





De vogel is waarschijnlijk afkomstig uit een Duitse vogel collectie en het zou dus om een kruising gaan tussen een Giervalk X Sakervalk.

Echt een hele mooie vogel die langs heel de Nederlandse kust regelmatig gezien word.

Wel grappig dat de vogel redelijk honkvast is op de Westplaat qua data.

Namelijk **22-10-2005**, **15-10-2006** en op **14-10-2007**