

Broedvogels Westplaat

Seizoen 2012



Broedvogelinventarisatie:

Gebied: Westplaat

Teljaar: 2012

Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap (beheerder).


Opdracht: Inventarisatie van broedvogels.

Tellers: Henk Walbroek, Jaap v Oudenaarden ,W Prins , lid van de vogelwerkgroep van de KNNV afd. Voorne.

Gebied: Topogr. krt. 36 – Atlasblok 38 – KM-blok 5
Topogr. krt. 37 – Atlasblok 31 – KM-blokken 31+32+33.

Noord = Waterkering van de Maasvlakte (zuidzijde).
Zuid = Slikken van Voorne met Westplaat en de zee.
Oost = Fietspad over Brielse Gatdam.
West = Slufterstrand Maasvlakte.

De in de tekening hieronder gearceerde sectoren, vormen het geïnventariseerde gebied!



Gebiedstype :

Een langgerekte strook kunstmatig aangelegd duinterrein, met daaraan grenzend een schor, slikken en zandbanken/strand. Het profiel, komt sterk overeen met elk aan zee grenzend jong duinterrein.

Het schor grenst aan een wadachtig gebied (Slikken van Voorne) en de zee. Langs het schor ligt een iets hoger gelegen strook grond met een wandelpad en aan weerszijde daarvan bosschages. Deze bosschages lopen aan de noordzijde van het wandelpad steil op tegen het talud van de waterkering van de Maasvlakte.

Westelijk van de Slikken en zuidelijk van de Kleine Slufter is de zee met strand en zandplaten. Het schor spoelt vrijwel alleen onder bij storm met springtij.

Eén enkel wandelpad loopt in de lengte richting door het oostelijke gedeelte, van het fietspad op de Brielse Gatdam tot aan een vogelkijkhut (2,5 km).

Het oostelijke deel van het gebied heeft een wandelpad met smalle- en bredere stroken met;

- Struiken, zoals; wilg, braam, vlier, duindoorn, vuilboom, wegedoorn, rozen, kardinaalshoed, kornoelje.
- Bomen, zoals; wilg, abeel, populier.
- Planten, zoals; heeblaadjes, koninginnekruid, brandnetel, watermunt, duinriet, biezen e.a.

Samen met het aangrenzende schor en de hoger gelegen waterkering (kwel) kan dit gebied als drassig worden gekenmerkt.

De struikenpartijen zijn vrijwel overal ondoordringbaar, met her en der een solitair staande boom of een groepje bomen met een max. hoogte van ca. 8 m.

Het westelijk deel bestaat uit al of niet kunstmatig aangelegde duinen en duintjes, begroeid met biestarwegras, helmgras en duindoorns. Dit terrein is niet vrij toegankelijk en onbegaanbaar door de dichte begroeiing met duindoornstruiken en soms een steile glooiing.

Dit gedeelte is de afgelopen jaren erg veranderd .Door invloed van wind en zee zijn de duinen op de plaat nagenoeg verdwenen en aan de noordkant veel afgeslagen .De plaat breidt zich wel uit naar het zuiden

Telwijze:

Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON-richtlijn gedaan, echter:

Het inventariseren in het oostelijk deel geschiedde alleen vanaf het hoofdpad en 2 zijpaden en bij laagwater ook langs de scheiding van schor en slikken.

Inventarisaties in het westelijk deel vond plaats door het volgen van de hoogwaterlijn en dat is bij hoogwater niet mogelijk en langs de weg aan de noordkant. De hoog gelegen waterkering van de Maasvlakte is overal te steil en ontoegankelijk door stekelige- en doornige struiken. De andere kant van de kering werd geteld vanaf de weg .

Teldata:

volgnr.	datum	aanv.	eind	temp.	wind ... Bft	bewolking	Henk	Jaap Wim	sectie
1	21-03-12	07.30	10.30	8 °C	Z 3/4	0%	x	x	O+W
2	05-04-12	07.00	10.00	5 °C	NO 2/3	100%	x	x	O+W
3	20-04-12	07.00	10.00	7 °C	ZW 3	80%	x	x	O+W
4	27-04-12	06.30	10.30	10 °C	ZW 5	0%	x	x	O+W
5	11-05-12	06.00	08.00	13 °C	ZW 5/6	100%		x	O
6	24-05-12	05.30	09.30	12 °C	N 1/2	50 %	x	x	O+W
7	01-06-12	06.00	09.30	13 °C	N 3	50%	x	x	O+W

Waargenomen soorten:

Op enkele uitzonderingen na, zijn alle soorten samengevat in de hierna volgende tabel .

De bergeend die moeilijk in een territorium zijn vast te leggen zijn wel in de tabel opgevoerd.

Bergeend, deze soort heeft hoofdzakelijk in het westelijke deel, in konijnenholen, gebroed.

In de maand mei werden op verschillende momenten groepen van ruim boven de 150 bergeenden geteld .Later in het seizoen zijn grote aantallen jongen gezien .Het aantal broedparen blijft een vraag maar wij hebben het idee dat ze toenemen in dit gebied .Het aantal broedparen is naar boven bij gesteld Dit jaar voor het eerst 2 paar spotvogel en 1 paar cetti,s zanger een welkome aanwinst .

Op de volgende pagina is er een overzicht vanaf 1998 t/m 2012

euring	soort	1998	1999	2002	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1610	Grauwe Gans	0	0	0	0	0	6	3	4	4	1	2
1700	Nijlgans	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1730	Bergeend	15	32	30	19	7	16	16	18	2	18	35
1820	Krakeend	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0
1860	Wilde Eend	2	5	2	3	1	1	1	1	3	2	1
2030	Kuifeend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Bruine Kiekendief	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2670	Havik	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
2690	Sperwer	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
3940	Fazant	14	6	5	16	18	15	11	11	9	9	8
4070	Waterral	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
4290	Meerkoet	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0
4500	Scholekster	17	10	11	10	11	7	8	2	5	4	2
4560	Kluut	30	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4690	Kleine Plevier	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4700	Bontbekplevier	0	0	0	1	3	6	3	0	2	0	0
4770	Strandplevier	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4930	Kievit	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Wulp	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5460	Tureluur	14	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0
5900	Stormmeeuw	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920	Zilvermeeuw	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Visdief	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6680	Holenduif	0	3	0	2	2	2	3	0	0	0	0
6700	Houtduif	1	1	1	2	4	1	2	4	2	1	2
6840	Turkse Tortel	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
6870	Zomertortel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7240	Koekoek	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
9760	Veldleeuwerik	6	5	3	0	1	2	1	1	1	0	0
9810	Oeverzwaluw	0	0	26	8	0	19	19	6	183	15	15
10110	Graspieper	13	11	12	17	7	5	8	4	4	3	3
10201	Witte Kwikstaart	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
10660	Winterkoning	7	14	11	23	23	41	42	12	12	10	16
10840	Heggenmus	18	33	12	36	33	43	54	29	27	18	30
10990	Roodborst	7	4	6	5	1	1	8	1	1	0	0
11040	Nachtegaal	3	5	6	11	16	12	13	26	20	21	25
11060	Blauwborst	15	13	14	18	19	20	16	9	17	6	10
11370	Paapje	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
11390	Roodborsttapuit	0	0	0	4	1	3	4	2	2	1	3
11460	Tapuit	6	9	3	2	3	1	2	0	0	0	0
11870	Merel	3	8	8	5	5	20	20	19	11	9	15
12360	Sprinkhaanzanger	1	1	0	0	0	1	2	0	2	3	1
12430	Rietzanger	0	1	3	3	4	2	4	0	6	5	6
12500	Bosrietzanger	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	5
12510	Kleine Karekiet	10	4	6	12	10	9	15	4	5	9	10
12740	Braamsluiper	6	2	8	14	11	10	8	8	12	5	4
12750	Grasmus	12	10	8	27	14	13	18	21	15	15	15
12760	Tuinfluter	2	3	0	8	5	7	8	8	5	10	6
12770	Zwartkop	2	2	5	14	11	14	9	13	11	16	17
13110	Tijftjaf	3	3	6	17	12	10	19	14	11	10	14
13120	Fitis	53	67	54	85	73	103	74	77	81	61	59
14370	Staartmees	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
14620	Pimpelmees	1	0	0	0	0	3	2	2	2	0	1
14640	Koolmees	3	0	0	0	1	1	3	8	5	3	5
15490	Ekster	4	2	1	1	2	5	4	5	14	4	5
15671	Zwarte Kraai	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2
15980	Ringmus	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
16530	Putter	0	0	0	0	0	0	0	9	7	8	5
16600	Kneu	21	11	16	19	28	41	48	31	52	15	43
17100	Goudvink	0	0	0	1	2	2	4	0	4	4	3
18770	Rietgors	8	7	9	17	16	8	7	6	10	3	11

Evaluatie:

De kneu is opvallend terug gekeerd en weer op het oude niveau .De bosrietzanger is vorig jaar niet waargenomen en dit jaar 5 paar .De winterkoning ,heggenmus en de nachtegaal met 25 nesten zijn toegenomen ,Ook werden 2 nieuwe soorten in het gebied geteld n/l ,spotvogel <2 > en de cetti,s zanger De zangvogels zijn nagenoeg gelijk gebleven .

Als je naar de gegevens van de laatste jaren kijkt zie je dat de stellopers,meeuwen het erg moeilijk hebben in dit gebied .De reden kan zijn ,katten ,vos en niet te vergeten wandelaars .De nesten die er waren zijn tijdens een storm ook nog weggespoeld .Weinig juveniele steltlopers waar genomen .Door de afsluiting van het strand Maasvlakte hadden we gehoopt op meer broedgevallen maar dat is helaas niet gebeurd .

Het gebied ten noorden van de vogelhut is zeer aan verandering onderhevig veel afslag van de kant een toekomst voor meer oeverwaluwen , vorming van zandbanken en platen die steeds door afslag zand hoger worden .Een gebied voor de steltlopers als het hoger is nu loopt het met hoogwater nog onder .

Het gebied komt volgens ons steeds meer onderdruk te staan door de recreatie rondom het gebied .

Aan de westkant de kitesurfers ,noordkant strandrecreatie en ook de kitesurfers hoewel die daar in de komende jaren naar hun eigen plek moeten op de 2^e Maasvlakte.

Het gebied blijft makkelijk bereikbaar vanuit het strand.

In het oostelijk deel vormen zich steeds meer duintjes /zandplaten tegen het riet .

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat al dit gebeuren zeker zijn invloed had op de broedsuccessen van verschillende soorten .Veel pogingen <nestkuiltjes> gezien maar leidde niet tot broeden

Het is niet per definitie zo dat verdwenen soorten hier niet meer als broedvogel terug komen, er zitten nu eenmaal schommelingen in de soorten en aantallen per soort.

Er worden ook soorten ondergewaardeerd door hun manier van leven/gedrag .

Aanbevelingen:

De hut staat nu wat hoger en verder naar achteren een verbetering maar de aandacht moet blijven.

Het scherm op het pad staat op instorten en wordt gammel .Een nieuw scherm zou geen overbodige luxe zijn en de struiken ervoor moten wat gesnoeid worden en als dat gebeurd misschien kunnen er aanpassingen gedaan worden aan de water ervoor .

Oostzijde:

Duidelijke signalering van honden aan de lijn bij het betreden van het gebied en bij het begin van het pad bij de slagboom.

Bij het hek het plaatsen van een vuilnisbak en een info bord waarom dit gebied zo belangrijk is voor de vogels en planten.Tijdens de trek van de vogels het een belangrijk foerageer gebied is en dat elke verstoring ongewenst is .

Westzijde: .

Verbeteren van afzetting en signalering op de scheiding tussen het openbare slufferstrand en het niet toegankelijke zgn. Kleine Sluffergebied.

Wij verwachten dat als het strand weer vrij gegeven wordt dat de druk vanaf de west zijde heel erg groot wordt .Zeker omdat het strand veel aantrekkelijker gemaakt wordt .

Het was voor ons een plezier om dit gebied te mogen inventariseren en we houden ons aanbevolen voor komend seizoen.

Henk , Jaap en Wim



