

Broedvogels Westplaat

Seizoen 2017



Broedvogelinventarisatie:

Gebied: Westplaat

Teljaar: 2017

Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap (beheerder).


Opdracht: Inventarisatie van broedvogels.

Tellers: Henk Walbroek, Wim Prins, Jaap Koekendorp, lid van de vogelwerkgroep van de KNNV afd. Voorne.

Gebied: Topogr. krt. 36 – Atlasblok 38 – KM-blok 5
Topogr. krt. 37 – Atlasblok 31 – KM-blokken 31+32+33.

Noord = Waterkering van de Maasvlakte (zuidzijde).
Zuid = Slikken van Voorne met Westplaat en de zee.
Oost = Fietspad over Brielse Gatdam.
West = Slufterstrand Maasvlakte.

De in de tekening hieronder gearceerde sectoren, vormen het geïnventariseerde gebied!



Gebiedstype :

Een langgerekte strook kunstmatig aangelegd duinterrein, met daaraan grenzend een schor, slikken en zandbanken/strand. Het profiel, komt sterk overeen met elk aan zee grenzend jong duinterrein.

Het schor grenst aan een wadachtig gebied (Slikken van Voorne) en de zee. Langs het schor ligt een strook grond met een wandelpad en aan weerszijde daarvan bosschages. Deze bosschages lopen aan de noordzijde van het wandelpad steil op tegen het talud van de waterkering van de Maasvlakte.

Westelijk van de Slikken en zuidelijk van de Kleine Slufter is de zee met strand en zandplaten. Het schor spoelt vrijwel alleen onder bij storm met springtij.

Eén enkel wandelpad loopt in de lengte richting door het oostelijke gedeelte, van het fietspad op de Brielse Gatdam tot aan een kijkscherm (2,5 km).

Het oostelijke deel van het gebied heeft een wandelpad met smalle- en bredere stroken met;

- Struiken, zoals; wilg, braam, vlier, duindoorn, vuilboom, wegedoorn, rozen, kardinaalshoed, kornoelje.
- Bomen, zoals; wilg, abeel, populier.
- Planten, zoals; heeblaadjes, koninginnekruid, brandnetel, watermunt, duinriet, biezten e.a.

Samen met het aangrenzende schor en de hoger gelegen waterkering (kwel) kan dit gebied als drassig worden gekenmerkt.

De struikenpartijen zijn vrijwel overal ondoordringbaar, met her en der een solitair staande boom of een groepje bomen met een max. hoogte van ca. 8 m.

Het westelijk deel bestaat uit al of niet kunstmatig aangelegde duinen en duintjes, begroeid met biestarwegras, helmgras en duindoorns. Dit terrein is niet vrij toegankelijk en onbegaanbaar door de dichte begroeiing met duindoornstruiken en soms een steile glooiing.

Dit gedeelte is de afgelopen jaren erg veranderd. Door invloed van wind en zee zijn de duinen op de plaat nagenoeg verdwenen en aan de noordkant zijn de duinen inmiddels weg. De plaat breidt zich wel uit naar het zuiden die langzaam wat hoger wordt.

Telwijze:

Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON-richtlijn gedaan, echter:

Het inventariseren in het oostelijk deel geschiedde alleen vanaf het hoofdpad en de twee zijpaden zijn niet meer begaanbaar en bij laagwater ook langs de scheiding van schor en slikken.

Inventarisaties in het westelijk deel vond plaats door het volgen van de hoogwaterlijn en langs de weg aan de noordkant. De hoog gelegen waterkering van de Maasvlakte is overal te steil en ontoegankelijk door stekelige- en doornige struiken. De andere kant van de kering werd geteld vanaf de weg.

Teldata:

volgnr.	datum	aanv.	eind	temp.	wind ... Bft	bewolking	Henk	Wim / Jaap	sectie
1	24-03-17	07.00	10.30	7°C	WNW 3	10%	x	x	O+W
2	05-04-17	07.00	09.15	10 °C	WNW 3	100%	x	x	O+W
3	19-04-17	06.30	10.00	7 °C	O 2	5%	x	x	O
4	04-05-17	06.30	10.00	10 °C	O 3	100%	x	x	O+W
5	18-05-17	06.30	09.45	15 °C	WNW 3	50%	x	x	O+W
6	31-05-17	06.30	09.30	16 °C	NW 4	5%	x	x	O+W
7	14-06-17	06.30	10.00	16 °C	ZO 2	0 %	x	x	O+W
8	28-06-17	06.30	10.15	17 °C	O 4	70 %	x	x	O+W

Waargenomen soorten:

In 2016 waren er 47 soorten waargenomen in 2017 38 soorten .

De bergeenden <holenbroeders> broeden meestal in het westelijk gedeelte en de Grauwe gans in het oostelijke deel .Wij hebben de aantallen gelijk gehouden omdat we de indruk hadden dat het niet minder is geworden en toch een behoorlijk aantal jongen hebben gezien.

De soorten die de laatste 5 jaar niet zijn waargenomen c.q. gebroed zijn hebben verwijderd uit de tabel

De spotvogel is uit de tabel verwijderd de laatste waarneming was in 2012.

Op de volgende pagina is er een overzicht vanaf 2005 t/m 2017.

Betekenis kleuren :

Soorten groen :Nieuw waarnemingen

Jaar rood : Minder waarnemingen

Jaar groen : Meer waarnemingen

Jaar wit : Gelijk gebleven

eurig	soort	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1610	Grauwe Gans	0	6	3	4	4	1	2	1	1	8	8	4
1730	Bergeend	7	16	16	18	2	18	35	20	20	22	20	20
1860	Wilde Eend	1	1	1	1	3	2	1	0	0	1	1	1
1940	Slobeend	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2600	Bruine Kiekendief	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2670	Havik	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
2690	Buizerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3940	Fazant	18	15	11	11	9	9	8	3	6	5	8	9
4500	Scholekster	11	7	8	2	5	4	2	3	3	6	7	13
5460	Tureluur	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
6680	Holenduif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6700	Houtduif	4	1	2	4	2	1	2	4	1	1	1	2
6840	Turkse Tortel	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
7240	Koekoek	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1	0
8760	Grote Bonte specht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9810	Oeverwaluw	0	19	19	6	183	15	15	14	26	30	81	0
10110	Graspieper	7	5	8	4	4	3	3	1	3	1	3	1
10201	Witte Kwikstaart	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	1	1
10660	Winterkoning	23	41	42	12	12	10	16	5	15	27	28	25
10840	Heggenmus	33	43	54	29	27	18	30	14	14	30	35	29
10990	Roodborst		1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	3
11040	Nachtegaal	16	12	13	26	20	21	25	27	28	34	29	18
11060	Blauwborst	19	20	16	9	17	6	10	6	6	11	7	7
11390	Roodborsttapuit	1	3	4	2	2	1	3	0	2	1	0	0
11870	Merel	5	20	20	19	11	9	15	19	21	13	13	13
12200	Zanglijster	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
12200	Cetti,s zanger	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	4	6
12360	Sprinkhaanzanger	0	1	2	0	2	3	1	3	0	2	3	3
12380	Snor	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
12430	Rietzanger	4	2	4	0	6	5	6	4	5	11	5	9
12500	Bosrietzanger	0	0	0	0	3	0	5	2	0	1	0	0
12510	Kleine Karekiet	10	9	15	4	5	9	10	9	5	13	3	8
12740	Braamsluiper	11	10	8	8	12	5	4	8	8	4	12	8
12750	Grasmus	14	13	18	21	15	15	15	10	14	9	12	14
12760	Tuinfluit	5	7	8	8	5	10	6	6	7	6	5	8
12770	Zwartkop	11	14	9	13	11	16	17	15	18	18	18	14
13110	Tijftjaf	12	10	19	14	11	10	14	14	15	24	16	15
13120	Fitis	73	103	74	77	81	61	59	54	56	56	42	45
14370	Staatmees	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2
14620	Pimpelmees	0	3	2	2	2	0	1	0	1	1	2	4
14640	Koolmees	1	1	3	8	5	3	5	0	1	8	6	3
14870	Boomkruiper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15490	Ekster	2	5	4	5	14	4	5	4	6	5	2	2
15671	Zwarte Kraai	0	0	1	2	2	0	2	1	0	1	1	0
15980	Ringmus	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
16360	Vink	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16530	Putter	0	0	0	9	7	8	5	3	6	6	6	4
16600	Kneu	28	41	48	31	52	15	43	31	32	25	31	20
17100	Goudvink	2	2	4	0	4	4	3	1	1	1	3	4
18770	Rietgors	16	8	7	6	10	3	11	3	2	3	5	9

Opvallende feiten: De bruine kiekendief en de havik zijn de vaste bewoners van het gebied. Broedresultaat van kiekendief 3 jongen en van de havik niet kunnen waarnemen. De kolonie van de oeverwaluw is dit seizoen niet waargenomen oorzaak onbekend. Een gedeelte is waarschijnlijk naar de vogelvallei verhuisd. Toename van nesten van de scholekster en pogingen van de bontbekplevier.

Op de meest westelijke kant van het gebied had zich een dwergstern kolonie gevestigd<43>territoria maar door een vloedgolf in de nacht van 28/5-29/5 alles weggespoeld en 2^e poging ook mislukt door hoogwater dat alles had ook invloed op de nesten van scholeksters.

De **vos** heeft z'n eerste slachtoffers gemaakt 6 dode ganzen gevonden en geen vogel op de slikken die ochtend of het gevolgen heeft voor de grondbroeders kunnen we niet bevestigen maar vermoeden het wel. Het aantal rietzangers is dit seizoen wat toegenomen in vergelijking met vorig seizoen.

De roodborst en de vink hebben na een aantal jaren weer een territoria.

Evaluatie:

Het gebied zie je de laatste jaren veranderen aan de buitenkant in het oostelijke gedeelte breiden de schorren zich uit en hoe verder je naar het westen gaat zie je dat er meer zand tegen de duinen komt en de plaat wat hoger komt dus geschikter voor de steltlopers. Weerzijde van het pad wordt de begroeiing steeds dichter waardoor soorten verdwijnen.

Door de aanleg van de 2^e Maasvlakte is het gebied aan de westkant erg druk geworden door de kite-surfers die regelmatig voor verstoring zorgen.

Aanbevelingen:

Misschien kan er over nagedacht worden om het scherm te vervangen voor een kijkhut die wat meer naar binnen geplaatst moet worden door b.v 2 containers op elkaar te plaatsen. Een mooi rustpunt met uitzicht over de slikken. Zo voorkomt je er misschien mee dat men daar minder geneigd is om het strand daar op te gaan.

Bij scherm halverwege pad is in het voorjaar gesnoeid vooral aan de zijanten daar is nu het uitzicht beter geworden maar het moet wel **bijgehouden** worden. Er moet eens naar gekeken worden of het mogelijk is om voor het scherm weer wat water te krijgen met wat eilandjes waardoor het aantrekkelijker wordt om daar te kijken. Misschien wat riet weghalen vanaf de Slikken naar het scherm. Misschien is het een optie om prullenbakken te plaatsen bij de schermen. Eventueel een project voor de vrijwilligers?

Dit alles kan volgens ons bijdragen om het gebied nog aantrekkelijker te maken.

Oostzijde:

Er zijn er allerlei info borden geplaatst bij de ingang van het gebied wat meer duidelijkheid geeft waarom dit gebied zo belangrijk is voor de vogels en planten en dat tijdens de trek van de vogels is het een belangrijk foerageer gebied en dat elke verstoring ongewenst is.

Westzijde:

Het is aan te raden om het **touw** tussen de palen westzijde te **handhaven**

Het blijft een zeer dynamisch gebied wat aan verandering onder hevig is de duinen op de plaat zijn nagenoeg verdwenen maar aan de zuid kant van de plaat zien we de plaat uitbreiden en hoger worden

We hebben dit gebied met veel enthousiasme geïnterviewd en we houden ons aanbevolen voor komend seizoen.

Henk, Wim en Jaap

